

Abacavir, Lamivudina



Marca comercial: Epzicom

El Epzicom es una combinación de dos medicamentos antirretrovirales, a saber, sulfato de abacavir (Ziagen) y lamivudina (Epivir). Estos dos medicamentos son inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (NRTI). Estos productos bloquean la transcriptasa inversa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo

El sulfato de abacavir y la lamivudina han sido autorizados individualmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños. Puesto que estos dos medicamentos suelen recetarse juntos, el Epzicom los combina en una sola tableta. El Epzicom fue autorizado por la FDA el 2 de agosto de 2004 para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos. Debe emplearse junto con otros tipos de medicamentos contra el VIH.

El Epzicom no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

Se fabrica en tabletas de administración oral.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada de Epzicom es una tableta diaria. Algunos pacientes, por ejemplo, los afectados por enfermedad de los riñones o del hígado, pueden necesitar diferentes dosis de abacavir o de lamivudina. Los pacientes que necesiten diferentes dosis de estos medicamentos no deben tomar Epzicom.

Contraindicaciones

Las advertencias y los efectos secundarios del Epzicom pueden ser similares a los del abacavir y la lamivudina cuando se toman por separado. (Para más información véase las hojas de datos sobre abacavir y de la lamivudina.) Las personas que hayan sufrido una reacción alérgica grave al abacavir no deben tomar Epzicom. Tampoco deben tomarlo las personas que tengan enfermedad del hígado o insuficiencia renal.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, el Epzicom puede causar algunos efectos nocivos. Contiene sulfato de abacavir, que ha causado graves reacciones alérgicas, algunas conducentes a la muerte. Las reacciones alérgicas graves suelen ocurrir durante las seis primeras semanas de la administración de este medicamento, pero pueden presentarse en cualquier momento. Los pacientes deben suspender el medicamento e informar al médico de inmediato si ocurre cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre repentina, erupción cutánea, cansancio o dolor intenso, diarrea, náusea, vómito, dolor de estómago, dolor de garganta, dificultad respiratoria, tos o malestar general. Estos síntomas se enumeran en la tarjeta de advertencia de la receta, que debe llevar el paciente consigo. Si un médico sospecha que hay una reacción alérgica, el paciente nunca debe tomar de nuevo abacavir ni un medicamento que contenga ese producto.

Los medicamentos empleados para fabricar el Epzicom pueden causar a veces casos mortales de acumulación de ácido láctico y enfermedad del hígado, así como problemas de la sangre o debilidad muscular. Es preciso informar al médico si un paciente que tome este medicamento sufre problemas del aparato digestivo, dolor o debilidad de las articulaciones o los músculos, dolor u hormigueo de las manos o los pies, dolor de cabeza, mareo y cansancio poco común.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso informar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Abacavir, Lamivudina, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en:

Abacavir, Lamivudina



Ensayos clínicos (cont.)

<http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Abacavir/Lamivudina AND HIV Infections.

Fabricantes

Abacavir sulfato/Lamivudine
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Epzicom
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este